

Calendario Nazionale Fimp 2009

Vaccino	3° mese ⁽¹⁾	5° mese	6° mese	7° mese	11° mese	13° mese	4°-6° anno	6° anno	12° anno	13°-15° anno
DTPa-IPV-Hib-HB <u>esavalente</u> (2)	DTPa-IPV-Hib-HB	DTPa-IPV-Hib-HB			DTPa-IPV-Hib-HB			DTPa-IPV		dTpa (3)
MPR						MPR	MPR			
Varicella						Varicella	Varicella			Varicella (4)
PCV	PCV	PCV			PCV					
Men C (5)						Men C				Men C (5a)
HPV									HPV (6)	HPV (7)
Influenza				Influenza (8)						
Rotavirus (9)	Rota									

LEGENDA

- 1) Intendesi dal 61° gg di vita
- 2) Esa (esavalente): Polio-Difterite-Tetano- Pertosse- Epatite B-Emofilo
- 3) Difterite-Tetano-pertosse acellulare
- 4) Due dosi per i recettivi
- 5) La schedula vaccinale a 2 dosi nel primo anno + 1 dose dopo l'anno rispetto all'unica dose al 13° mese può essere stabilita dal pdf in considerazione delle condizioni sociali e sanitarie del soggetto e del nucleo familiare
 - 5a) unica dose
- 6) Il vaccino è offerto a tutte le undicenni: si intendono le ragazze che compiono 11 anni nell'anno solare oggetto della campagna vaccinale. (per il 2008 sono tutte le nate nel 1997)
- In base al vaccino usato i tempi di somministrazione sono:
 - 0, 1, 6 mesi (Cervarix)
 - 0, 2, 6 mesi (Gardasil)
- 7) Un eventuale catch-up è consigliabile tra i 12 e i 26 anni.
- 8) Dose annuale, nei soggetti a rischio dai 6 mesi per tutta l'età pediatrica
- 9) Si può somministrare dalle sei settimane di vita: la schedula a 2 o a 3 dosi dipende dal tipo di vaccino utilizzato

N.B.: in caso di mamma HBsAg+ si effettua una dose suppletiva di vaccino HB alla nascita