

## RICHIAMI

Da valutare solo per i bambini vaccinati nel corso del primo anno di vita.

### 3 - Quando vaccinare

Considerato che, escluse le situazioni a rischio particolarmente elevato, le vaccinazioni saranno eseguite prevalentemente nel 2° anno di vita, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Vaccinazioni eseguite prima del 15° mese di vita: tenuto conto delle priorità dell'attuale calendario vaccinale, la somministrazione del vaccino sarà eseguita a distanza di almeno due settimane da quella della 3° dose di esavalente, eventualmente somministrata contemporaneamente ad una dose di eptavalente coniugato contro lo pneumococco qualora la schedula per tale vaccino non fosse ancora completata.

- Vaccinazioni eseguite dopo il 15° mese di vita: tenuto conto delle priorità dell'attuale calendario vaccinale, la somministrazione del vaccino sarà eseguita a distanza di almeno due settimane da quella del vaccino MPR, eventualmente somministrata contemporaneamente ad una dose di eptavalente coniugato contro lo pneumococco qualora la schedala per tale vaccino non fosse ancora completata.

I Referenti distrettuali delle attività vaccinali sono invitati a trasmettere copia della presente nota ai Pediatri operanti nel territorio di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA  
( Dott. Cuccia Mario )